

## କୃଷି ସୁଚନା ସେବା (ଧାନ)

ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ.- ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭

୨୦୧୮ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର:

ବୁଣାଧାନ:

- ବାର୍ଷିକ ଶୁଣ୍ଠି ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଟା ବୁଣା କରାଯାଇଥିବା ଜମିରେ ଯଦି କୌଣସି ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ, ତେବେ ବେଉଷଣି କରି ଏକର ପିଛା ୧୨ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ପ୍ରଥମ ମୂଳସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ବାର୍ଷିକ ଶୁଣ୍ଠି ମଧ୍ୟମ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ପିଲ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂଳସାର ହିଁ ସାବରେ ଏକର ପିଛା ୧୨ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକର ପାଦୁର୍କାବ ଦେଖାଗଲେ ଶତକଡ଼ା ୦.୪ କ୍ଲୋରାଣ୍ଟାନିଲିପ୍ରୋଲ ଦାନାଦାର ୧୬ ଗ୍ରାମ ଏକର ପିଛା ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାଣ୍ଟାନିଲିପ୍ରୋଲ ଶତକଡ଼ା ୧୮.୫ ଏସି ୧୨ ମିଲି ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।

ରୁଆଧାନ:

- ଜମି ଓଦାଳିଆ ଥିଲେ କିମ୍ବା ୨ – ୩ ସେ.ମି. ଠିଆ ପାଣି ଥିବା ବାର୍ଷିକ ଶୁଣ୍ଠି ରୁଆ ଧାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ବେନ୍ ସଲଫ୍ୟୁରାନ୍ ମିଥାଇଲ୍ ସହିତ ପ୍ରେଟିଲାଇକ୍ଲୋର୍ (ରେଡିମିକ୍ସ) ଦାନାଦାର ଯାହାକି ଲୋଣ୍ଡାକ୍ସ ପାଖାର ନାମରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ଏହାକୁ ୪ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୪ କି.ଗ୍ରା. ବାଲିରେ ମିଶାଇ, ରୋଇବାର ୩ ରୁ ୫ ଦିନ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ଯଦି ଚାଷୀ ଧାନ ରୋଇବାର ୩ ରୁ ୫ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥାନ୍ତି ତେବେ ଏକର ପିଛା ଇଥୋକ୍ସିସଲଫ୍ୟୁରନ୍ (ସନରାଇସ) ୫୦ ଗ୍ରାମ ୧୨୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଜମିରେ ଅଧିକା ପରିମାଣର ଚଉଡ଼ା ପତରିଆ ଗୁଳ୍ମ ଦେଖାଦେଲେ ପେନୋକ୍ସିଲାନ (ଗ୍ରାନାଇର୍) ୪୦ ମି.ଲି. ଏକର ପିଛା ୧୨୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଦଣ୍ଡା ପରିମାଣ କମ ଥିବା ଜମିରେ, ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ ଶେଷଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ନଥିଲେ Zn-EDTA କୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ଅଧାଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ତଳି ରୋଇବାର ୩୦ ଦିନ ଏବଂ ୪୫ ଦିନ ପରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଅନ୍ୟ ଗଛରୁ ପିଲ ବାହାର କରି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଦେଖାଦେବ ତଥା ବର୍ଗମିଟର ପିଛା ୩୩ଟି ବୁଦା ରହିବା ଦରକାର।
- ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଲୁଆ ରୁଆ ଧାନ ଜମିରେ ପିଲ ଆସିବା ସମୟରେ ଏକର ପିଛା ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ସହିତ ୧୩.୫ କି.ଗ୍ରା. ଏମ୍.ଓ.ପି. ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରୁଆ ଧାନରେ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୪ ଟି ହିଁ ସାବରେ ଯୌନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଫେରୋମନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ବସାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ରପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ଟି ହୋଇଯିବ, ଏକର ପିଛା ୪ କି.ଗ୍ରା. ରାଇନାକ୍ସିପାର ୦.୪ କି ଔଷଧ ସହ ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ସଅଳ ରୁଆ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଗଛରେ ପତ୍ରାଛଦ ପୋଡ଼ା ବା ସାପକାତିଆ ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ମି.ଲି. ଆମିଷ୍ଟାର୍ କିମ୍ବା ସିଥମାର୍- ୩ (ଭାଲିଡାମାଇସିନ୍ ୩ ଏଲ) ୨ ମି.ଲି. ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
- ଧାନ ଗଛରେ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା/ପତ୍ରାଗାର ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ପ୍ଲ୍ୟୁଫୋମାଇସିନ୍ ୧ ଗ୍ରାମ ସହିତ ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ କପର୍ ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୧ ଗ୍ରାମ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ୧ ଏକର ଜମି ପାଇଁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।

\*\*\*\*\*