

କୃଷି ସୂଚନା ସେବା (ଧାନ)

ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ.-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭

୨୦୧୮ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଜାଣିପାଆନ୍ତୁ :

ବୁଣାଧାନ:

ବର୍ଷାଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଟା ବୁଣା କରାଯାଇଥିବା ଜମିରେ ଯଦି କୌଣସି ଘାସମରା ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇନାହିଁ, ତେବେ ବେଉଷଣି କରି ଏକର ପିଛା ୧୨ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ ପ୍ରଥମ ମୂଳସାର ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

ରୁଆ ଧାନ:

- ❖ ଯଦି ତଳିଘରାରେ ବକାନେ (Bakane) ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୧୨% ସହିତ ମାକୋଜେବ୍ ୬୩% ତବ୍ୟୁ.ପି. (ସାପ୍ , ରିପର, ସିକ୍ସର କିମ୍ବା କମ୍ପାନିଅନ୍ ଇତ୍ୟାଦି) ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ପତ୍ରଚିତା ରୋଗ ପାଇଁ ଟ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜୋଲ୍ ୭୫ ତବ୍ୟୁ.ପି. ଔଷଧକୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ୦.୬ ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ତଳିଘରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ ତବ୍ୟୁ.ପି. (୨ ଗ୍ରାମ୍ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ) ରେ ମିଶାଯାଇଥିବା ଦ୍ରବଣରେ ତଳିର ମୂଳକୁ ବୁଡ଼ାଇବା ପରେ ତଳିକୁ ରୁଅନ୍ତୁ ।
- ❖ ତଳିଘରାରୁ ତଳିକୁ ଉପାଡ଼ିବା ପରେ ଏହାକୁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦ ଇ.ସି.(୧ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ) ଦ୍ରବଣରେ ତଳିମୂଳକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଇବାର ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୋକ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହୁଏ ।
- ❖ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ପ୍ରାଦୂର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ତଳିକୁ ସ୍ପ୍ରେୟମାଲସିନ୍ (୦.୧ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ) ଦ୍ରବଣରେ ତଳି ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ସୁଧା ତଳି ରୋଇବା କାମ ସାରିଦେବା ଉଚିତ୍ । ଅଧିକ ଅମଳ କ୍ଷମ କିମ୍ବା ପାଇଁ ଶେଷଥର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏକର ପିଛା (କ)୪ କି.ଗ୍ରା.ସ୍ଫୁରିଆ, ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଡି.ଏ.ପି. ଏବଂ ୧୩.୫ କି.ଗ୍ରା. ଏମ୍.ଓ.ପି କିମ୍ବା (ଖ) ୧୭ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ, ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା. ଏସ୍.ଏସ୍.ପି ଏବଂ ୧୩.୫ କି.ଗ୍ରା ଏମ୍.ଓ.ପି. ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ ଦମନ ପାଇଁ ବେନ୍ସଲଫ୍ୟୁରନ୍ ମିଥାଇଲ୍ ସହିତ ପ୍ରିଟିଲାକ୍ଲୋର (ରେଡିମିକ୍ସ) ଦାନାଦାର ଯାହାକି ଲୋଣ୍ଡାକୁ ପାଖୁର ନାମରେ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ଏହାକୁ ୪ କି.ଗ୍ରା ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୪ କି.ଗ୍ରା. ବାଲିରେ ମିଶାଇ, ରୋଇବାର ୩ ରୁ ୫ ଦିନ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଦସ୍ତା ପରିମାଣ କମ୍ ଥିବା ଜମିରେ, ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍‌କୁ ପ୍ରତି ଏକର ଜମିରେ ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ଶେଷଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା Zn-EDTA କୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ଅଧାଗ୍ରାମ୍ ମିଶାଇ ଦୁଇଥର, ଯଥା ତଳି ରୋଇବାର ୩୦ ଦିନ ଏବଂ ୪୫ ଦିନ ପରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ପ୍ରତି ବୁଡ଼ାରେ ୨ ରୁ ୩ ଟି ହିସାବରେ ତଳି ଏବଂ ଧାତିକୁ ଧାତି ୨୦ ସେ.ମି. ଓ ବୁଡ଼ାକୁ ବୁଡ଼ା ୧୫ ସେ.ମି. ବ୍ୟବଧାନରେ ରୋଇଦିଅନ୍ତୁ । ରୋଇବାର ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧ ରୁ ୨ ସେ.ମି. ଠିଆ ପାଣି ବିଲରେ ରଖନ୍ତୁ । ତଳି ଅଧିକ ଦିନର ହୋଇଯାଇ ଥିଲେ, ବୁଡ଼ାପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ଟି ତଳି ରୁଅନ୍ତୁ ।
- ❖ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ ପ୍ରାଦୂର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ, ତଳି ରୋଇବା ସମୟରେ ବିଲରେ ୮ ରୁ ୧୦ ଧାତି ରୋଇବା ପରେ ଗୋଟେ ଧାତି ଖାଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋକର ଆକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପି ନଥାଏ ।
- ❖ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ନିରାକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ରୁଆଧାନରେ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ୪ଟି ହିସାବରେ ଯୌନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଫେରୋମନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ବସାନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ରପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ଟି ହୋଇଯିବ, ଏକର ପିଛା ୪ କି.ଗ୍ରା. ରାଇନାକ୍ଟିପାର ୦.୪ କି ଔଷଧ ସହ ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

❖ ଶୀଘ୍ର ଡଳି ରୁଆଯାଇଥିବା ଜମିରେ, ଯଦି ଉକୁଣିଆପୋକ (Thrips) ଏବଂ ହଳଦିଆ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଦେଖାଯାଏ, ସେଠାରେ ଋଷୀମାନେ ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଔଷଧ ଯଥା ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ୍ ୦.୧୪ % କୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୨.୫ ଲିଟର କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ଔଷଧ କ୍ଲୋରାନିଗ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୦.୪% ଜି.ଆରକୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୪୦ ଗ୍ରାମ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ପାଇଁ କ୍ଲୋରାନିଗ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୧୮.୫% ଏସ.ସି.କୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୩୦ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଉକୁଣିଆ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଲାମଡା-ସାଇହାଲୋଥ୍ରିନ୍ ୫% ଇସି.କୁ ୧୨.୫ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା କିମ୍ବା ଥାୟାମେଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲୁ.ଜିକୁ ୨୫ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
