

କୃଷି ସୁଚନା ସେବା (ଧାନ)

ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ.-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭

୨୦୧୮ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଜାଣିପାଆନ୍ତୁ :

- ❖ ରୁଆ ଧାନରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିସାର ହିସାବରେ ଏକ ଡିଗ୍ରାମ୍ମାଂଶ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର (ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କିସମ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ଏବଂ ଶଙ୍କର ଧାନ ପାଇଁ ୨୮ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ) ଧାନ ରୁଆର ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ପରେ ଘାସ ବାଛି ସାରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ସଥଳ ବା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ରୁଆଯାଇଥିବା ଧାନରେ ଏକ ଡିଗ୍ରାମ୍ମାଂଶ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର (ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଧାନ କିସମ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୨୪ କି.ଗ୍ରା. ଏବଂ ଶଙ୍କର ଧାନ ପାଇଁ ୨୮ କି.ଗ୍ରା. ସ୍ଫୁରିଆ) ଧାନ ରୁଆର ୪୦ ରୁ ୪୫ ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ସାର ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ କାଣ୍ଡବିହୀ ପୋକ ଏବଂ ପତ୍ରମୋଡା ପୋକର ନିରାକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ରୁଆ ଧାନରେ ଏକର ପିଛା ୩ ଟି ହିସାବରେ ଯୌନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯତ୍ରା ରଖନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯତ୍ରା ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ଟି ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏକର ପିଛା ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଔଷଧ ଯଥା ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ୍ ୦.୧୫% କୁ ଏକର ପିଛା ୮୦୦ ମି.ଲି. ଔଷଧ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପିଛା କ୍ଲୋରାନ୍ ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ ୪ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ (ବକଡା ପୋକ) ଦୁଦାପ୍ରତି ୫ ରୁ ୧୦ ଟି ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଜମିର ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ଜମିରେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ପାଣି ନରହିବା ଦରକାର । ଏହାପରେ ଯଦି ପୋକ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏକର ପିଛା ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଔଷଧ ଯଥା ଆଜାଡିରାକ୍ଟିନ୍ ୦.୧୫% କୁ ଏକର ପିଛା ୮୦୦ ମି.ଲି. ଔଷଧ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପିଛା ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ୍ ୫୦ % ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି ୧୨୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଡିନୋଟେମ୍ପୁରନ୍ ୨୦% ଏସ୍.ଜି ୮୦ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮% ଏସ୍.ଏଲ୍. ୫୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଏସିପ୍ରେଟ୍ ୭୫% ଏସ୍.ପି. ୪୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଏକର ପିଛା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ସଦାସର୍ବଦା ଉପଯୁକ୍ତ କୀଟନାଶକ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ବଙ୍ଗାପୋକ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା କାର୍ବୋଥାଇଫାନ୍ ୨୫% ଇ.ସି. ୪୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା କାରଗାପ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪ ଜି. ୧୦ କି.ଗ୍ରା କିମ୍ବା କାର୍ବୋଥାଇଫାନ୍ ୩ ଜି. ୧୩ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପତ୍ରପୋଡାଗାର ରୋଗ ଧାନରେ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଏକର ପିଛା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ୩୦ ଗ୍ରାମ୍ ସହିତ କପରଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୮ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ଏକର ପିଛା କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ପି. ୪୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇସାଇକ୍ଲୋଜୋଲ୍ ୭୫ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ପି. (ବିମ୍-୭୫ କିମ୍ବା ସିଭିକ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରାମ୍) ୧୨୦ ଗ୍ରାମ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଯଦି ଧାନ ବିଲରେ ଦୁଦାପ୍ରତି ୧ ରୁ ୩ ଟି ଗଛ ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଠାରୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଘାସ ଗଛ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ବକାନେ ରୋଗ କୁହାଯାଏ । ଏଭଳି ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୁଜା କିସମରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୪୦୦ ଗ୍ରାମ୍ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ପି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ କିମ୍ବା ଟିଲ୍ଡ ୨୦୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ ଦୁଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଉଜାଜମିରେ ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ପିଛା ୨-୩ ଟି ଗଣ୍ଡିପୋକ ଦେଖାଦେଲେ, ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମିଥାଇଲ୍ ପାରାଥାୟନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଫସଲ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନ କଲାବେଳେ ପାଗ ପରିଷ୍କାର ଥିବା ଦରକାର । ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ❖ ପତ୍ରାଛଦ ପୋଡା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ (i) ଭାଲିଡାମାଇସିନ୍ (କ) ସିଥମାଲ୍ ୩ ଏଲ୍.୨ ମି.ଲି. ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ କିମ୍ବା (ଖ) ରାଇଜୋସିନ୍ ୩ ଏଲ୍. ୨.୫ ମି.ଲି. ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ କିମ୍ବା (ii) ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ୍ ତଥା କକ୍ଷାପ୍ ୫ ଇ.ସି. ୨୦୦ ମି.ଲି. ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ କିମ୍ବା (iii) ଅପ୍ଲୁଜାମିଡ୍ ୨୪% ଏସ୍.ସି. ଯଥା ସ୍ତେନ୍ସର୍ ୧ ମି.ଲି. ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ କିମ୍ବା (iv) କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ପି. ଯଥା ବାଭିଷିନ୍ ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
