

କୃଷି ସୂଚନା ସେବା (ଧୋନ)

ଡା.କୁ.ଅନ୍ତୁ.ପ.-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭

୨୦୧୯ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି :

- ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହଳଦିଆ କାଣ୍ଡବିଦ୍ଵା ପୋକ, ପତ୍ରମୋଡା ପୋକ, ବାଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ, ଧଳା ପତ୍ରତିଆଁ ଏବଂ ଗନ୍ଧି ପୋକର ଆର୍ବିଭାବ ହୋଇପାରେ । ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସାମା ହେଲା :
 - ହଳଦିଆ କାଣ୍ଡବିଦ୍ଵା ପୋକ-୧-୨ ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାପତି କିମ୍ବା ବର୍ଗମିଟର ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟାପୁଞ୍ଜୀ (କିମ୍ବା ହେକ୍ଟାର ପିଛା ୮ ଟି ଯୌନ ସଂବେଦନ ଶାଳ ଯତ୍ତା ବସାକ୍ତ୍ର) । ସେଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ ୪-୫ଟି ପୁରୁଷ ପ୍ରକାପତି ଦେଖାବେଲେ)
 - ପତ୍ରମୋଡା ପୋକ-ବୁଦାପ୍ରତି ୧-୨ ଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପତ୍ର
 - ଧଳା ପତ୍ରତିଆଁ ପୋକ-ବୁଦାପ୍ରତି ୫-୧୦ ଟି ପୋକ

(ବି.ଦ୍ରୁ. ବାଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ ଏବଂ ଧଳା ପତ୍ରତିଆଁ ପୋକର ଆର୍ବିଭାବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧାନ ଗଛର ମୂଳକୁ ଗୋଟିଏ ବାତି ଦ୍ୱାରା ହାଲୁକା ଭାବେ ବାତେଇ ଦେଲେ ପୋକଗୁଡ଼ିକ ତଳେଥିବା ପାଣିକୁ ତେଣୁପଢ଼ିବେ । ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛେବ)

ଆର୍ଥିକ ଦେହଳୀ ସାମାରୁ ପୋକର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୋକମରା ଔଷଧ ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

- ହଳଦିଆ କାଣ୍ଡବିଦ୍ଵା ପୋକର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ରାଇନାକ୍ରିପାର ୨୦ ଏସ.ସି. ୭୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇଜୋପେସ୍ ୪୦ ଇ.ସି. ୪୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଏସିଫେଟ୍ ୩୫ ଏସ.ସି. ୩୦୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିପେସ୍ ୨୦ ଇ.ସି. ୧୦୦୦ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ପତ୍ରମୋଡା ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ଟ୍ରାଇଜୋପେସ୍ ୪୦ ଇ.ସି. ୪୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ୪୦ ଗ୍ର. ଥାଯୋମିଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫ ଡବ୍‌ସି.କିମ୍ବା ୫ ମି.ଲି. ନିମ୍ବତେଲ ସହିତ ଶତକଡ଼ା ୨ ଭାଗ ସାବୁନ ପାଣି ଏକ ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ବାଦାମୀ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ / ଧଳା ପତ୍ରତିଆଁ ପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮ ଏସ.୬ଲ. ୪୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ୪୦ ଗ୍ରାମ ଥାଯୋମିଥୋକ୍ସାମ୍ ୨୫ ଡବ୍‌ସି.କିମ୍ବା ୨୦୦ ମି.ଲି. କ୍ଲୋଫେନପ୍ରକ୍ରିୟା ୧୦ ଇ.ସି. କିମ୍ବା ୫ ମି.ଲି. ନିମ୍ବତେଲ ସହିତ ଶତକଡ଼ା ୨ ଭାଗ ସାବୁନ ପାଣିକୁ ଏକ ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯଥା ମହିଷା, ପତ୍ରାଛାଦ ପୋଡା, ପତ୍ରପୋଡା, ପତ୍ରଗାର ପୋଡା ଏବଂ ପତ୍ରାଛାଦ ସଢ଼ା ରୋଗ ପାଇଁ ସାବଧାନତା ଅବଳମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର । ଯନ୍ତି ଆରଶ୍ୟକ ପତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପକ୍ଷତି ଅବଳମ୍ବନ କରନ୍ତୁ :

- ପତ୍ରପୋଡା / ପତ୍ରଗାର ପୋଡା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ୧ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେପ୍‌ସାଇକ୍ଲିନ୍ ୧୫୦ ମି.ଗ୍ରା. ସହିତ କପର ଅଙ୍କିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୧ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ୮ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଏକ ଏକର ସିଞ୍ଚନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

- ମହିଷା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୫୦% ସହିତ ଟ୍ରିଫ୍ଲୋର୍ଫିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୨୫% (ନାଟିଭୋ ୭୫ ଡବ୍ୟୁ.ଜି.) ୦.୪ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ କାରବେନ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ ଡବ୍ୟୁ.ପି. କିମ୍ବା ୦.୭ ଗ୍ରାମ ଟାଇସାଇକ୍ଲୁଜୋଲ ସିଅନ୍ କରିବା ଦରକାର । ଏତର୍ଥେ ୨୫ ଗ୍ରାମ ପତ୍ର ବେଳପତ୍ର ରସ କିମ୍ବା ଡୁଲସା ପତ୍ର ରସ କିମ୍ବା ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ନିଷ୍ପ ପତ୍ର ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଅନ୍ କଲେ ଏହି ରୋଗ ଦମନ ହୋଇଥାଏ ।
- ପତ୍ରାଙ୍କାଦ ପୋଡା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରୋପିକୋନାଜିଲ ୨୫% (ଟିଲୁ) ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ କିମ୍ବା ରାଇକୋସିନ୍ ଗୀ ଏଲ୍ କିମ୍ବା ସିଥମାର ଗୀ ଏଲ୍ ୨ ମି.ଲି. ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । କିମ୍ବା ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୫୦% ସହିତ ଟ୍ରିଫ୍ଲୋର୍ଫିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୨୫% (ନାଟିଭୋ ୭୫ ଡବ୍ୟୁ.ଜି.) ୦.୪ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା କଣ୍ଟାପଂ୍କ ୫ ଇ.ସି. (ହେକ୍ଟାକୋନାଜିଲ୍ ୫ଇ.ସି. ୨ ମି.ଲି.) କିମ୍ବା ଥିପ୍ଲୁଜମିଡ୍ ୨୪ ଏସ.ସି. ୧ ମି.ଲି. ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାରିଷ୍ଟିନ୍ ୫୦ ଡବ୍ୟୁ.ପି.(କାରବେନ୍ଡାଜିମ୍ ୫୦ ଡବ୍ୟୁ.ପି.) ୨.୫ ଗ୍ରାମ ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ସର୍ବଦା ମନେରଖୁବା ଉଚିତ ଯେ ପାଗ ପରିଷାର ଥିବା ସମୟରେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ । ଗୁଷ୍ଠାଭାଇମାନେ ଧାନ ରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସ୍ଵର୍ଗତା ବା ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ବିକଟିତ “ରାଇସ ଏକ୍ସପର୍ଟ” ମୋବାଇଲ ଆପ” (Rice Expert), ଯାହାକି Google Play Store ରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
