

କୃଷି ସୁଚନା ସେବା

ଭା.କୃ.ଅନୁ.ପ-ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ-୭୫୩୦୦୭

୨୦୨୦ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର :

ଉଚ୍ଚା ଜମିରେ ଶୁଖିଲା ବୁଣାଧାନ:

- ❖ ଉଚ୍ଚା ଜମିରେ ବୁଣା ଧାନରେ ଧାନ ପାଚି ଆସିବା ସମୟରେ ବୁଢ଼ାପ୍ରତି ୨ଟି ବା ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟରରେ ୫ଟି ଗନ୍ଧିପୋକ ଦେଖାଦେଲେ, କୀଟନାଶକ ପାଉଁର ମାଲ୍ୟୁଥର୍ ୫% ଏକର ପିଛା ୧୦ କେ.ଜି. କିମ୍ବା ଇଥୋଫେନ୍‌ପ୍ରକ୍ ୧୦ ଇସି ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦% ଇସି ଏକର ପିଛା ୧୦୦୦ ମି.ଲି. ସିଞ୍ଚନ କରି ଗନ୍ଧିପୋକ ଦମନ କରନ୍ତୁ ।

ରୁଆଧାନ :

- ❖ ବିଳମ୍ବରେ ରୁଆ ହୋଇଥିବା ଧାନରେ ପ୍ରଥମ କିଣ୍ଡିସାର ହିସାବରେ ଏକର ପ୍ରତି ୨୪ କେ.ଜି. ଯୁରିଆ ଏବଂ ୧୩.୫ କେ.ଜି. ଏମ୍.ଡି.ପି ସାର ଧାନ ରୁଆର ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ସଫଳ ବା ସଠିକ ସମୟରେ ରୁଆପାଇଥିବା ଧାନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଣ୍ଡିସାର ବା ପିଲସାର ହିସାବରେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୨ କେ.ଜି. ଯୁରିଆ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ କାଣ୍ଡବିକ୍ଷା ପୋକର ନିରାଶୟ ପାଇଁ, ରୁଆ ଧାନରେ ଏକର ପିଛା ୪ ଟି ହିସାବରେ ଯୌନ ସମ୍ପେଦନଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରା (ଫେରୋମନ୍ ଟ୍ରାପ୍) ରଖନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯନ୍ତ୍ରା ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏକର ପିଛା ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଔଷଧ ଯଥା ଆକାଡିରାକ୍ଟିନ୍ ୦.୧୫% ୮୦୦ ମି.ଲି. ଔଷଧ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାନ୍‌ଡ୍ରାମିଲିପ୍ରୋଲ ୦.୪ କି. ଟ କେ.ଜି ଔଷଧ ୪ କେ.ଜି. ଶୁଖିଲା ବାଲିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାନ୍‌ଡ୍ରାମିଲିପ୍ରୋଲ ୧୮.୫ ଏମ୍.ସି. ୬୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ବଙ୍ଗାପୋକ ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ଥାଇମିଥୋକ୍ସାମ ୨୫% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି ୪୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଫିପ୍ରୋଥ୍ରାକ୍ସ ୫% ଏମ୍.ସି. ୪୦୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ୨୦ ଇସି ୫୦୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡିପୋକ (ଚକଡା ପୋକ) ବୁଢ଼ା ପ୍ରତି ୫ ରୁ ୧୦ ଟି ପୋକ ଦେଖାଦେଲେ ଜମିରେ ପାଣି ବେଶୀ ଦିନ ଜମି ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି ଜମିର ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଜମି କୁମାଗତ ଭାବେ ଡବା ବା ଶୁଖିଲା ରହିବ ନାହିଁ । ଏହାପରେ ଯଦି ପୋକ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏକର ପିଛା ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଔଷଧ ଯଥା ଆକାଡିରାକ୍ଟିନ୍ ୦.୧୫% ୮୦୦ ମି.ଲି. ଔଷଧ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି ପାଇମେପ୍ରୋକ୍ସିମ ୫୦% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି ୧୨୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଡିନୋଟେଫ୍ୟୁରନ୍ ୨୦% ଏମ୍.ଜି ୮୦ ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ୧୭.୮ % ଏମ୍.ଏଲ ୫୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଏସିଫେଟ ୭୫% ଏମ୍.ପି. ୪୦୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ସମାସର୍ବଦା ଉପଯୁକ୍ତ କୀଟନାଶକ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଯଦି ପତ୍ରପୋତା, ପତ୍ରପୋତାଗାର ରୋଗ ଧାନରେ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଏକ ଏକର ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକର ପିଛା ଷ୍ଟେପ୍ଟୋସାଇକ୍ଲିନ୍ ୩୦ ଗ୍ରାମ୍ ସହିତ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୮ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨ ଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ପତ୍ରାଛଦ ପୋତା ରୋଗ ଦମନ ପାଇଁ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୫୦% ସହିତ ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋକ୍ସିକ୍ସିବିନ୍ ୨୫% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ଜି ୦.୪ ଗ୍ରାମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ ୨୫% ୧ ମି.ଲି. ଏକ ଲିଟର ପାଣିରେ କିମ୍ବା ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ ୫୦% ୨ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ୨-୧୦ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଦୁଇଥର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଦେଲେ ଏକର ପ୍ରତି ମାନ୍‌କୋଜେବ୍ ୬୩% ସହିତ କାର୍ବୋକ୍ସାକ୍ଟିମ୍ ୧୨% ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ କୁ ଏକ ଲିଟର ପାଣି ହିସାବରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ । ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଔଷଧ ତଥା ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋକ୍ସିକ୍ସିବିନ୍ ସହିତ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ (୨୫% ଡବ୍ଲ୍ୟୁ.ପି.) ୦.୪ ଗ୍ରାମ୍ ଏକ ମି.ଲି. ପାଣିରେ କିମ୍ବା ଆଜୋକ୍ସିକ୍ସିବିନ୍ ସହିତ ଡିଫେନକୋନାଜୋଲ ୩୨୫ ଏମ୍.ସି. ୧ ମି.ଲି. ୧ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ରୂକ୍ଷାଭାଲମାନେ ଧାନ ରୂକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ବା ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ରାଇସ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ (RiceXpert) ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେୟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
