



૧૦૨૪ મિસિન્સ ફેંડુયારી માસ હૃતીય પક્ષ પાછું કાર્યપદ્ધતિ

૧) ઢાલુથ રૂથા ધાન

ઢળિયા પાછું

- ❖ યદી ઢાલુથા પોક દેખાયાએ, તેબે એકર પ્રતિ નિમન મંજુરુ તિથારિ ઓષ્ઠ આજાટિરાનું ૦.૧૪% ટુંદી ૮૦ મિ.લિ. કિમા લાયદા વાકદ્વાલોટ્રિન ૪% કિ.સી. ૧૦૦ મિ.લિ. કિમા થાયાસિથોસ્ટામ ૧૪% તર્ફું.જિ. ૪૦ ગ્રામ સીંચન કરન્તુ।
- ❖ ધાન ઢળિયે પદ્ધતો રોગ દેખાગલે એકર પ્રતિ કાર્બેશનિમ ૪૦૦ ગ્રામ કિમા પ્રોપિકોનાજોલ ૧૦૦ ગ્રામ ૧૦૦ લિટર પાણીને મિશાય સીંચન કરન્તુ।

મુખ્ય જમિયે ઢળ રૂથા બાકિથૂલે

- ❖ રૂથા બાકિથૂલે ઢાલુથ જમિયે રોપણ કાર્ય શેષ કરિદિઅન્તુ।
- ❖ ધાન ઢળિકું બુદા પ્રતિ ૩ રૂ ૪ ટી હિસાબરે ૧૪ X ૧૪ એ.મી. બયબહાનરે ૩ રૂ ૪ એપ્રાન્ન ઢળિકું શિધાભાનરે ઓ અંશ ગાળીયારે રોકબા ઉચ્ચિત।
- ❖ (ટે.એ.પિ. ૪૪ કિ.ગ્રા. + એમ.૩.પિ. ૧૧ કિ.ગ્રા.) કિમા યેદુરિથા ૧૧ કિ.ગ્રા.+એસ.એસ.પિ. ૧૭૪ કિ.ગ્રા. + એમ.૩.પિ. ૧૧ કિ.ગ્રા.) શેષથર કાદુથ કરિબા સમયરે મૂલદાર ભાવે બયબહાર કરન્તુ।

એબે એબે મુખ્ય જમિયે ઢળિરૂથા પાછથૂલે

- ❖ રૂથા ધાનરે બાલુજાં દમાન પાછું બેન્સલપ્યુરાન મિથાકલ સહિત પ્રેટિલાન્કોર (લોણાકું પાંચાર / જરેજણ્ણ) પ્રતિ એકર પિછા ૪ કિ.ગ્રા. હિસાબરે રોકબાર ૪-૮ દિન પરે પ્રયોગ કરન્તુ। એહા દાનાદાર હોકથુબારુ એહાસહિત પ્રતિ એકર પિછા ૪ કિ.ગ્રા. બાલી મિશાય બિલરે સમાન કરી પ્રયોગ કરન્તુ કિમા ધાન રોકબાર ૩ રૂ ૪ દિન પરે પાછરાજોસલપ્યુરાન-જથાકલ ૧૦ તર્ફું.પિ. (સોથુ) એકર પિછા ૮૦ ગ્રામ પ્રયોગ કરન્તુ નચુબા બિસ્પાકરિબાકું સોચિયમ (નોમિનિગોલુ) ૧૭૦ મિ.લિ. ૧૪૦ લિટર પાણીને મિશાય ધાન રોકબાર ૧૦ રૂ ૧૪ દિન પરે અર્થાત ઘાસ ૨ રૂ ૩ પત્ર હોકથુબા અબસ્થારે સીંચન કરન્તુ।
- ❖ કાણ્ણબિના પોકર નિરાશણ પાછું એકર પ્રતિ ૩ ગોટિ યોન સમેદનશાલ યન્ત્રા (ફેરોમાન ગ્રાઘ) રખન્તુ। યેતેબેલે ગોટિએ દિનરે યન્ત્રા પ્રતિ ૪ રૂ ૪ પૂરુષ પ્રજાપત્ર પઢાયે, તેબે

একর পিছা নিম্ন মঙ্গরু তিআরি ঔষধ যথা আজাতিরাক্ষীন ০.১৪% ৮০০ মি.লি. ঔষধ ৯০০ লিটর পাণিরে মিশাই সিংচন করন্তু কিম্বা কেুৰান্তুনিলিপ্রোল ৪% জি.আর ৪ কে.জি কিম্বা কাৰ্টোপ্ৰাৰে হাইড্ৰোকেুৰাইচ্চ ৪ জি. ১০ কি.গ্ৰা. সমান পরিমাণৰ শুষ্কলা বালিৰে মিশাই প্ৰয়োগ কৰন্তু কিম্বা কেুৰান্তুনিলিপ্রোল ১৮.৪% এস.এ. ৭০ মি.লি. ৭০০ লিটৰ পাণিৰে মিশাই সিংচন কৰন্তু।

- ❖ যদি বকনি রোগ দেখায়াও তেবে ১ লিটৰ পাণিৰে ১ গ্ৰা. কাৰ্বেণ্টজিম ৪০ তক্ষু.পি মিশাই সিংচন কৰন্তু এবং ৩ রু ১০ দিন ব্যবহাৰৰে দ্বিতীয়বাৰ প্ৰয়োগ কৰন্তু।

মূল্য জমিৰে তলি চেৱ ধৰি মজবুত হোক ঘাৰিথুলে

- ❖ ষক্তিয পিল অবস্থাৰে (তেলিৰুআৰ ৭০ রু ৭৪ দিন পৰে) একৰ প্ৰতি ৩৪কি.গ্ৰা. ঘুৰিআ প্ৰথম শাৰ্শস্বার ভাবৰে প্ৰয়োগ কৰন্তু।
- ❖ রক্ষা যদি পূৰ্বৰু কৌশলি ঘাষ নিয়ন্ত্ৰণ ঔষধ ব্যবহাৰ কৰি নাহান্তি তেবে পেনোক্সুলম ১.০৭% + সাইহালোপোপ-ভুঁটাইল ৪.১% (ভিভায়া) ৮০০ মি.লি. প্ৰতি একৰ হিসাবৰে ১৪ রু ৭০ দিন পৰে সিংচন কৰন্তু কিম্বা ৭০ রু ৭৪ দিন পৰে হাতৰে ঘাষবান্তি দিঅন্তু।
- ❖ কাৰ্ণিকাপোকৰ নিৰীক্ষণ জাৰি রহন্তু। যেতেবেলে পুৰুষ প্ৰজাপতিৰ সংশ্যা গোটিএ দিনৰে যন্তা প্ৰতি ৪ রু ৪ টি হোকয়িব, তেবে একৰ পিছা নিম্ন মঙ্গরু তিআরি ঔষধ যথা আজাতিৰাক্ষীন ০.১৪% ৮০০ মি.লি. ৭০০ লিটৰ পাণিৰে মিশাই সিংচন কৰন্তু কিম্বা একৰ পিছা কেুৰান্তুনিলিপ্রোল ৪% জি.আর ৪ কি.গ্ৰা.কু ৪ কি.গ্ৰা. বালি সহিত সমান ভাবৰে মিশাই প্ৰয়োগ কৰন্তু কিম্বা কেুৰান্তুনিলিপ্রোল ১৮.৪% এস.এ. ৭০ মি.লি. একৰ পিছা ৭০০ লিটৰ পাণিৰে মিশাই সিংচন কৰন্তু কিম্বা একৰ পিছা কাৰ্টোপ্ৰাৰে হাইড্ৰোকেুৰাইচ্চ ৪ জি. ১০ কি.গ্ৰা. ব্যবহাৰ কৰন্তু।

৭. কাৰ্য বুণা তালু ধান

- ❖ ঘাষ নিয়ন্ত্ৰণ পাইঁ ধান বুশিৰাৰ ৪ রু ১০ দিন পৰে বেনসলপুৰান-মিথাইল সহিত প্ৰেটিলাকেুৰ (কেোণ্টাকু পাঞ্চাৰ/কৈৱেজষুঁজ) দানাদাৰ একৰকু ৪ কি.গ্ৰা. হিসাবৰে সমান পৰিমাণৰ বালি সহিত মিশাই প্ৰয়োগ কৰন্তু কিম্বা ধান বুশিৰাৰ ১০ রু ১৭ দিন পৰে অৰ্থাৎ ৭ রু ৩ পত্ৰিশিৰ্ষ ঘাষ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবা পাইঁ বিষপাইচিবাক ঘোতিয়ম (নেমিনিগোলু) ১৭০ মি.লি. কিম্বা ধান বুশিৰাৰ ১৪ রু ১০ দিন পৰে একৰ প্ৰতি ৮০০ মি.লি. পেনোক্সুলম ১.০৭%+ সাইহালোপোপ-ভুঁটাইল ৪.১% ১৪০ লিটৰ পাণিৰে মিশাই সিংচন কৰন্তু।
- ❖ ধান বুণাৰ ৭০ রু ৭৪ দিন পৰে পিল বাহুৰিবা সময়ৰে শাৰ্শস্বার হিসাবৰে একৰ প্ৰতি ৭৪ কি.গ্ৰা. ঘুৰিআ প্ৰয়োগ কৰন্তু।
- ❖ কাৰ্ণিকা পোক নিৰীক্ষণ পাইঁ একৰ পিছা ৩টি হিসাবৰে যৌন সমেদনশাল পন্তা রহন্তু। যেতেবেলে পুৰুষ প্ৰজাপতিৰ সংশ্যা গোটিএ দিনৰে যন্তা প্ৰতি ৪ রু ৪ টি হোকয়িব, তেবে একৰ পিছা নিম্নমঙ্গরু তিআরি ঔষধ যথা আজাতিৰাক্ষীন ০.১৪%কু ৮০০ মি.লি. কিম্বা একৰ

ପିଛା କ୍ଲୋରାନଟାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୪% ଜି.ଆର. ୪ କି.ଗ୍ରା. କୁ ୧୦୧ ବା ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମା କ୍ଲୋରାନଟାନିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୧୮.୫% ଏସ.ସି. ୨୦ ମି.ଲି. ଏକର ପିଛା ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।

- ❖ ଯଦି ମହିଳାରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ କାର୍ବେଣ୍ଟାଜିମ୍ ୪୦ ଡବ୍‌୧.୫ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ କିମା ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋସିଷ୍ଟ୍‌ବିନ୍ ୨୫% + ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୫୦% ୮୦ ଗ୍ରାମ କିମା ଏତିଫେନଫଂସ୍ ୫୦ ଲ.ସି. ୨୦୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ଲିଟର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।
- ❖ ରାଷ୍ଟ୍ରୀଭାଇମାନେ ଧାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ବା ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥୁଲେ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ , କଟକ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ରାଜସ୍ ଏକ୍ସପାର୍ଟ୍ ମୋବାଇଲ ଆପ (riceXpert) ଗୁରୁଲ୍ ପ୍ଲଟ୍‌ରେଣ୍ଟ ଡାଟନଲୋଡ କରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
