



କୃଷି ସ୍ମୃତି ଯେବା (ଧାନ)

୨୦୨୪ ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର :

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଧାନରୁ ହେଉଥିବା ଆଂଚଳରେ ହୁଲଦିଆ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।

- ❖ ଏହି ପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରୁଆ ଧାନରେ ଏକର ପିଛା ଣଟି ହୁଷାବରେ ଯୌନ ସମେଦନଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରା ରଖନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯନ୍ତ୍ରାପ୍ରତି ଣଟି ଦେଖାଯିବ ତେବେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ନିମ୍ନ ମଂଜିରୁ ତିଆରି ଅଷ୍ଟଧ ଆଜାତିରାକ୍ଷିନ୍ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାନ୍ ଟ୍ରାନ୍‌ସିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୪% ଜି.ଆର. ଏକର ପ୍ରତି ୪ କି.ଗ୍ରା. କିମ୍ବା କାର୍ଟ୍‌ପ୍ଲ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪ଜି. ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ସମାନ ପରିମାଣର ବାଲି ସବୁ ମିଶାଇ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାନ୍ ଟ୍ରାନ୍‌ସିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୧୮.୪% ଏସ.ସି. ୭୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ । କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁବେନ୍‌ଡିମାଇଡ୍ ୪୮୦ ଏସ.ସି. ୨୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଏକ ଏକରରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୋକର ଅଣ୍ଟା ବିଲରେ ଦେଖାଯିବ ତେବେ ଏକର ପିଛା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଇକୋକାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ସପ୍ତାହ ଅନ୍ତରରେ ୪ ରୁ ୫ ଥର ଏହି ଭଳି କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
- ❖ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିଲରେ ଏହି ପୋକର ଅଣ୍ଟା ଦେଖିବେ ତେବେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ।
- ❖ ବୟକ୍ତ ପୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିବାପାଇଁ ଆଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
- ❖ ଗଛର ତଳଭାଗରେ ହୁଲଦିଆ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକର ଅଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ବୁଢାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଜଳସେଚନର ପ୍ରତି ବଢାଇବା ଦରକାର ।

୧) ରୁଆ ତାଳୁଅ ଧାନ

- ❖ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଘାସ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଘାସମରା ଅଷ୍ଟଧ ପକାଯାଇନଥୁଲେ, ରୋଇବାର ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେନୋକ୍ଲୁଲମ୍ ୧.୦୯% + ସାଇହାଲୋଫୋପ- ବ୍ୟଟାଇଲ୍ ୫.୧% ୮୦୦ ମି.ଲି. ପ୍ରତି ଏକର ହୁଷାବରେ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୨୦ ଦିନରେ ଥରେ ୩ ଓ ୪୦ ଦିନରେ ଆରଥରେ ହାତରେ ଘାସବାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ଧାତି ରୁଆ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଅଙ୍କୁଳିବିଦା ଯନ୍ତ୍ର /କୋନୋଡ଼ିଟର/ଧାନଟିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ୨୦ ଦିନ ଓ ୪୦ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ଘାସ ଦମନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧାପୋକର ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୩ ଗୋଟି ଯୌନ ସମେଦନଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରା ରଖନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯନ୍ତ୍ରା ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତି ପତିରେ, ତେବେ ଏକର ପିଛା ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି ଅଷ୍ଟଧ ଯଥା ଆଜାତିରାକ୍ଷିନ୍ ୦.୧୫% ୮୦୦ ମି.ଲି. ଅଷ୍ଟଧ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାନ୍ ଟ୍ରାନ୍‌ସିଲିପ୍ରୋଲ୍ ୦.୪% ଜି.ଆର ୪ କେ.ଜି କିମ୍ବା କାର୍ଟ୍‌ପ୍ଲ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ୪ଜି.

୪ ଜି. ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ସମାନ ପରିମାଣର ଶୁଖ୍ଲା ବାଳିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମା ଏକର ପ୍ରତି ୧୨୦ ମି.ଲି. ଟେଟ୍ରାନ୍ତିଲିପ୍ରୋଲ ୨୦୦ ଜି/ଏଲ ଏସ.ସି. କିମା କ୍ଲୋରାନ୍ତର୍ନିଲିପ୍ରୋଲ ୧୮.୫% ଏସ.ସି. ୩୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସୀଚନ କରନ୍ତୁ ।

- ❖ ବିଳମ୍ବରେ ରୁଆ ଯାଇଥୁବା ଧାନରେ ପ୍ରଥମ ଶାର୍ଷସାର ହିସାବରେ ଏକର ପ୍ରତି ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ପିଲ ବାହାରିବା ସମୟରେ (୨୦-୨୫ ଦିନରେ) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୁଆଯାଇଥୁବା ଧାନରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଶାର୍ଷସାର ହିସାବରେ ଏକର ପ୍ରତି ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ଏବଂ ୧୧ କି.ଗ୍ରା. ଏମ.୩.୩. ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଯଦି ମହିଷାରୋଗ ଦେଖାଯାଏ, ଟ୍ରାଇପ୍ଲୋକିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୨୫% + ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୫୦% ଏକର ପ୍ରତି ୮୦ ଗ୍ରାମ କିମା ଏତିଫେନଫଂସ୍ ୪୦ ଲ.ସି. ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ମି.ଲି. କିମା ଏକର ପ୍ରତି କାସ୍ତୁଗାମାଇସିନ୍ ୩ ଏସ.୬ଲ. ୫୦୦ ମି.ଲି., ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସୀଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଯଦି ପତ୍ରଚିତାରୋଗ ଦେଖାଯିଏ ତେବେ ଏକର ପିଛା ୫୦୦ ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଟାଜିମ୍ ୧୭% + ମାଙ୍କୋଜେର ଗଣ% ଡବ୍ୟ.୩. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସୀଚନ କରନ୍ତୁ କିମା ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ମି.ଲି. ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସୀଚନ କରନ୍ତୁ ।

୨) କାଦୁଆ ବୁଣା ତାଳୁଆ ଧାନ

- ❖ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୩ଟି ହିସାବରେ ଯୌନ ସତ୍ୱେଦନଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରା ରଖନ୍ତୁ । ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜାପତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯନ୍ତ୍ରା ପ୍ରତି ୪ ରୁ ୫ ଟି ହୋଇଯିବ, ତେବେ ନିମ୍ନ ମଞ୍ଜିରୁ ଚିଆରି ଅନ୍ତର୍ଧ ଯଥା ଆଜାତିରାକ୍ଷିନ୍ ୦.୧୪%କୁ ଏକର ପ୍ରତି ୮୦୦ ମି.ଲି. କିଭା ଏକର ପିଛା କ୍ଲୋରାନ୍ତର୍ନିଲିପ୍ରୋଲ ୦.୮% ଜି.ଆର. ୪ କି.ଗ୍ରା. କୁ ୧୦୦ ବା ସମାନ ପରିମାଣର ବାଳି ସହିତ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ କିମା ଏକର ପ୍ରତି ୧୨୦ ମି.ଲି. ଟେଟ୍ରାନ୍ତର୍ନିଲିପ୍ରୋଲ ୨୦୦ ଜି/ଏଲ ଏସ.ସି. କିମା କ୍ଲୋରାନ୍ତର୍ନିଲିପ୍ରୋଲ ୧୮.୫% ଏସ.ସି. ଏକର ପ୍ରତି ୩୦ ମି.ଲି. ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସୀଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ରକ୍ଷା ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଘାସ ନିଯନ୍ତ୍ରଣ ଅନ୍ତର୍ଧ ବ୍ୟବହାରକରି ନାହାନ୍ତି ତେବେ ପେନୋସ୍କୁଲମ୍ ୧.୦୯% + ସାଇହାଲୋଫୋପ୍-ବ୍ୟଟାଇଲ ୪.୧% ଏକର ପିଛା ୮୦୦ ମି.ଲି. ବୁଣିବାର ୧୫ ରୁ ୨୦ ଦିନରେ ୧୪୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସୀଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ଯଦି ମହିଷାରୋଗ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଟ୍ରାଇପ୍ଲୋକିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ ୨୫% + ଟେବୁକୋନାଜୋଲ ୫୦% ଏକର ପିଛା ୮୦ ଗ୍ରାମ କିମା ଏତିଫେନଫଂସ୍ ୪୦ ଲ.ସି. ଏକର ପ୍ରତି ୨୦୦ ମି.ଲି. କିମା କାସ୍ତୁଗାମାଇସିନ୍ ୩ ଏସ.୬ଲ. ୫୦୦ ମି.ଲି., ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସୀଚନ କରନ୍ତୁ ।
- ❖ ରକ୍ଷାଭାଇମାନେ ଧାନ ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ବା ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, କଟକ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ରାଜସ ଏକ୍ଲାପୋର୍ଟ ମୋବାଇଲ ଆପ (riceXpert) ଗୁଗୁଲ ଫ୍ଲେଷ୍କୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
